

Patiëntenboekje

Informatie voor de patiënt, ouder(s)
en/of verzorger(s) van de patiënt.

Let op bij gebruik van LIVMARLI®▼ 9,5 mg/ml drank (maralixibat) voor de behandeling van Progressieve Familiale Intrahepatische Cholestase (PFIC) bij patiënten in de leeftijd van 3 maanden en ouder.

Maralixibat is de werkzame stof in het medicijn.
Uw medicijn kan een merknaam hebben die anders is dan de werkzame stof. Kijk dus goed over welk medicijn dit gaat.

Dit boekje is bedoeld voor patiënten die maralixibat kregen voorgeschreven voor de behandeling van progressieve familiale intrahepatische cholestase (PFIC) en/of hun ouder(s) of verzorger(s).

- De hoeveelheid maralixibat die een patiënt moet nemen (de dosis) is gebaseerd op het lichaamsgewicht van de patiënt. De arts/zorgverlener berekent deze dosis. Hij/zij bepaald hoeveel medicijn moet worden ingenomen en welke maat doseerspuit voor orale (via de mond) toediening daarvoor gebruikt moet worden. Deze informatie wordt in dit patiëntenboekje opgeschreven.
- Neem dit patiëntenboekje mee bij ieder bezoek aan de arts/zorgverlener.

Meld bijwerkingen bij het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb.

▼ Dit medicijn staat onder extra toezicht. Dit zorgt ervoor dat we snel nieuwe informatie over de veiligheid van dit medicijn verkrijgen.

Neem contact op met uw arts als u last krijgt van bijwerkingen. Doe dit ook bij bijwerkingen die niet in de bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen melden via het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden helpt u ons aan meer informatie over de veiligheid van dit medicijn.

MEER INFORMATIE

Deze informatie is ook terug te vinden op
<https://livmarli-armm.nl>
via het scannen van



Lees de bijsluiter voor meer informatie
over uw medicijn op
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl.



Het is belangrijk dat u de bijsluiter leest voordat u of uw kind start met de behandeling. Heeft u nog vragen over maralixibat of PFIC? Twijfel dan niet om contact op te nemen met uw arts, verpleegkundige of apotheker.

Dit materiaal is goedgekeurd door het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

DEZE PAGINA DIENT DOOR DE BEHANDELEND ARTS/ ZORGVERLENER INGEVULD TE WORDEN

NAAM VAN DE PATIËNT

GEBOORTEDATUM

STARTDATUM VAN DE BEHANDELING

NAAM VAN DE ARTS

**DEZE TABEL MAG ALLEEN WORDEN INGEVULD DOOR
DE VOORSCHRIJVEND ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE**

1 Datum	2 Gewicht patiënt (kg)	3 Toe te dienen hoeveelheid maralixibat (ml)	4 Te gebruiken spuitmaat (0,5 ml / 1 ml / 3 ml)	5 Inname (eenmaal daags of tweemaal daags)

Wijze van toediening: Maralixibat is een vloeistof die via de mond (oraal) wordt ingenomen met behulp van een doseerspuit. Het moet tot 30 minuten vóór of bij een maaltijd worden ingenomen: 's ochtends voor de eenmaaldaagse toediening, of 's ochtends en 's avonds voor de tweemaaldaagse toediening.

**DEZE TABEL MAG ALLEEN WORDEN INGEVULD DOOR
DE VOORSCHRIJVEND ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE**

1 Datum	2 Gewicht patiënt (kg)	3 Toe te dienen hoeveelheid maralixibat (ml)	4 Te gebruiken spuitmaat (0,5 ml / 1 ml / 3 ml)	5 Inname (eenmaal daags of tweemaal daags)

Wijze van toediening: Maralixibat is een vloeistof die via de mond (oraal) wordt ingenomen met behulp van een doseerspuit. Het moet tot 30 minuten vóór of bij een maaltijd worden ingenomen: 's ochtends voor de eenmaaldaagse toediening, of 's ochtends en 's avonds voor de tweemaaldaagse toediening.

**DEZE TABEL MAG ALLEEN WORDEN INGEVULD DOOR
DE VOORSCHRIJVEND ARTS OF VERPLEEGKUNDIGE**

1 Datum	2 Gewicht patiënt (kg)	3 Toe te dienen hoeveelheid maralixibat (ml)	4 Te gebruiken spuitmaat (0,5 ml / 1 ml / 3 ml)	5 Inname (eenmaal daags of tweemaal daags)

Wijze van toediening: Maralixibat is een vloeistof die via de mond (oraal) wordt ingenomen met behulp van een doseerspuit. Het moet tot 30 minuten vóór of bij een maaltijd worden ingenomen: 's ochtends voor de eenmaaldaagse toediening, of 's ochtends en 's avonds voor de tweemaaldaagse toediening.

AANTEKENING

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....